Poučení pro pacienta / Příprava před vyšetřením

Pracoviště:	MAPO care Praha, Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Poskytovatel:	MAPO gastro s.r.o., tř. Kosmonautů 1338/1c, 779 00 Olomouc - Hodolany, IČO: 27778070, DIČ: CZ27778070

Úkon – gastroskopie – poučení pro pacienta

Gastroskopie je vyšetření horní části trávicí trubice pomocí tenkého ohebného přístroje (endoskopu), který se zavádí ústy do jícnu, žaludku a dvanáctníku. Lékař při vyšetření kontroluje sliznici a podle potřeby může odebrat malý vzorek tkáně k dalšímu vyšetření. Samotné vyšetření je krátké a obvykle trvá do 10 minut.

Většina vyšetření na našem pracovišti probíhá **v lokální anestezii**, tedy po znecitlivění hltanu anestetikem ve spreji. Po aplikaci lokální anestezie nesmí pacient **1 hodinu jíst ani pít**.

Ve výjimečných případech, zejména u pacientů s výraznou úzkostí nebo zvýšeným dávivým reflexem, lze na přání pacienta provést vyšetření **v nitrožilní analgosedaci**. Při analgosedaci jsou podávány krátce působící léky ze skupiny benzodiazepinů a opiátů, které pomáhají zmírnit úzkost a nepříjemné pocity. Pacient zůstává během vyšetření při vědomí a je schopen spolupracovat.

Před vyšetřením jsou léky podány do žíly a během výkonu jsou sledovány základní životní funkce. Po vyšetření je pacient převezen na dospávací pokoj, kde je dále monitorován až do odeznění účinku léku.

Po podání sedace pacient nesmí po dobu 24 hodin řídit motorová vozidla. Dále se doporučuje po tuto dobu nepít alkohol a nevykonávat činnosti vyžadující zvýšenou pozornost. Po vyšetření v nitrožilní analgosedaci musí být pacient propuštěn **v doprovodu odpovědné dospělé osoby**.

Analgosedace může být spojena zejména s rizikem **útlumu dýchání**, proto je její podání možné **pouze po zhodnocení celkového zdravotního stavu a se souhlasem lékaře provádějícího vyšetření**.

Gastroskopie v analgosedaci je na našem pracovišti **zpoplatněna dle aktuálně platného ceníku.**

Příprava před vyšetřením

Nejméně 6 hodin před plánovaným vyšetřením nejezte a nekuřte. Nejméně 4 hodiny před plánovaným výkonem nepijte.

Pravidelnou medikaci užijte a zapijte ji malým douškem vody.

V době lačnění před výkonem **neužívejte perorální antidiabetika a neaplikujte inzulín**, pokud Vám lékař neurčí jinak.

Pokud užíváte **léky na ředění krve**, informujte o tom lékaře provádějícího vyšetření. S výjimkou terapeutických výkonů není vysazení těchto léků nutné, a to ani v případě odběru bioptických vzorků. Pokud užíváte **warfarin**, přineste s sebou aktuální výsledek INR, který by neměl být starší než 48 hodin.